




/ Denominación

Toponímico de Arbeca, localidad de Lérida dónde se supone que se inició su cultivo.

De vigor reducido, lo que permite su utilización en plantaciones intensivas. Posee una capacidad de enraizamiento elevada.



/ Difusión e importancia

Es la variedad más importante de Cataluña donde ocupa más de 55.000 ha. También se encuentra ampliamente difundida en Aragón y, recientemente, en Andalucía, donde ocupa más de 20.000 ha en plantaciones intensivas.



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Media
POLEN	Calidad media
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Precoz
PRODUCCIÓN	Elevada
MADURACIÓN DE FRUTO	Temprana
RENDIMIENTO GRASO	Elevada
PROPAGACIÓN	Estaquillado
ACEITE	Calidad excelente, por sus buenas características organolépticas, aunque de baja estabilidad.

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Árbol	
VIGOR	Bajo
PORTE	Abierto
DENSIDAD DE LA COPA	Media
Hoja	
FORMA	Elíptica
LONGITUD	Corta
ANCHURA	Media
CURVATURA	Epinástica
Fruto	
PESO	Bajo
FORMA	Esférica
GRADO DE ASIMETRÍA	Simétrico
DIÁMETRO	Hacia la base
ÁPICE	Redondeado
BASE	Redondeada
PEZÓN	Ausente
LENTICELAS	Escasas y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Negro