



## / Denominación

Es conocida con diversas denominaciones que generalmente hacen referencia a la forma curvada o alargada de su fruto como cabrilla, cornal, cornatillo, cornetilla...

*Presenta una elevada resistencia al desprendimiento del fruto. Adaptación a suelos pobres y zonas secas y frías. Es especialmente sensible a tuberculosis, verticilosis y repilo. También es sensible a los ataques de mosca.*



## / Difusión e importancia

Es la segunda variedad española en cuanto a superficie cultivada. Actualmente ocupa más de 270.000 ha en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Badajoz y Cáceres.



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



### CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Tardía
POLEN	Baja germinabilidad
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Tardía
PRODUCCIÓN	Elevada y alternante
MADURACIÓN DE FRUTO	Tardía
RENDIMIENTO GRASO	Alto
PROPAGACIÓN	Fácil por estaquillado semileñoso
ACEITE	Presenta un color amarillo oro con reflejos verdosos que anticipan el atributo afrutado

### CARACTERES MORFOLÓGICOS

Árbol	
VIGOR	Bajo
PORTE	Erguido
DENSIDAD DE LA COPA	Espesa
Hoja	
FORMA	Elíptico-Lanceolada
LONGITUD	Media
ANCHURA	Media
CURVATURA	Espesa
Fruto	
PESO	Medio
FORMA	Alargada
GRADO DE ASIMETRÍA	Asimétrico
DIÁMETRO	Centrado
ÁPICE	Apuntado
BASE	Truncada
PEZÓN	Ausente
LENTICELAS	Abundantes y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Rojo vinoso