



/ Denominación

Esta denominación hace referencia al color claro de sus hojas. También se le conoce en diversas localidades cordobesas con las sinonimias de Casta de Lucena en Cabra y Lucentino en Baena, Cabra y Castro del Río.

Su capacidad de enraizamiento se considera media. Sus frutos presentan una elevada resistencia al desprendimiento que dificulta la recolección mecanizada.



/ Difusión e importancia

Es la tercera variedad española en cuanto a superficie cultivada. Actualmente ocupa más de 265.000 ha en las provincias de Córdoba (43%), Málaga (30%), Sevilla (17%) y Granada (10%).



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Media-Tardía
POLEN	Calidad media
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Media
PRODUCCIÓN	Elevada y alternante
MADURACIÓN DE FRUTO	Tardía
RENDIMIENTO GRASO	Bajo
PROPAGACIÓN	Estaquillado
ACEITE	Ácidos grasos muy equilibrada, ácidos saturados relativamente más bajos que en otras variedades

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Árbol	
VIGOR	Medio
PORTE	Erguido
DENSIDAD DE LA COPA	Media
Hoja	
FORMA	Lanceolada
LONGITUD	Larga
ANCHURA	Media
CURVATURA	Plana
Fruto	
PESO	Elevado
FORMA	Ovoidal
GRADO DE ASIMETRÍA	Simétrico
DIÁMETRO	Centrado
ÁPICE	Redondeado
BASE	Redondeada
PEZÓN	Ausente
LENTICELAS	Abundantes y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Violeta negro