



/ Información planta

Originario de Chipre, es una variedad vigorosa y productiva.

Aunque es una planta que no tiene grandes necesidades hídricas, sí es aconsejable que en los primeros años de la plantación estén garantizadas. Sobre todo y especialmente en el periodo estival, que suele coincidir con la época más seca del año. De esta manera el porcentaje de marras se minimiza bastante. Soporta 650 horas de frío y necesita 800 horas de frío. Su floración es temprana, en la primera semana de abril.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

VIGOR DEL ÁRBOL	Medio
PRODUCCIÓN	Media
FLORACIÓN	Temprana
PERIODO JUVENIL	Medio
POLINIZADOR	C-Especial
MADURACIÓN	Temprana
VEGERÍA	Media



/ Información fruto

Tiene un fruto mediano y alargado con muy buen sabor. Tiene una vejería moderada, precoz en entrada en producción, con una elevada cantidad de frutos abiertos. Variedad adaptada a la zona centro de la península ibérica y zonas con pocas horas-frío.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

TAMAÑO FRUTO	Medio
FORMA FRUTO	Alargado
BLANCURA CÁSCARA	Bajo
DEHISCENCIA	Alta
FRUTOS VACÍOS	Baja



COMPARATIVA DE FLORACIONES

VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
KERMAN		●	
LARNAKA	●		
SIRORA		●	
PETER			●
C-SPECIAL	●		



/ Información sobre los portainjertos

La siguiente tabla muestra la comparativa de los tres portainjertos disponibles en el mercado actualmente.

Un portainjerto es la parte de la planta que contiene el sistema radicular en la que más tarde se adhiere el injerto (variedad).

Para una adecuada elección del portainjerto deben valorarse factores relacionados, en su mayoría, con el tipo de suelo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
CARACTERÍSTICAS	Terebinthus	Atlántica	UCB1
PRODUCCIÓN	Media	Alta	Alta
VIGOR	Moderado	Moderado-Alto	Alto
PRECOCIDAD ENTRADA PRODUCCIÓN	Baja	Baja	Muy alta
AFINIDAD DEL INJERTO	Buena	Buena	Buena
LONGEVIDAD	Elevada	Elevada	Elevada
RESISTENCIA AL FRÍO	Muy elevada	Elevada	Elevada
RESISTENCIA BAJAS TEMPERATURAS	Elevada	Media	Media
RESISTENCIA A LA SALINIDAD	Baja	Buena	Buena
RESISTENCIA A LA CALIZA	Buena	Buena	Buena
RUSTICIDAD	Elevada	Buena	Buena
Plagas y enfermedades			
RESISTENCIA ANEMATODOS	Buena	Mala	Baja
RESISTENCIA A ARMILLARIA	Buena	Mala	Buena
RESISTENCIA A PHYTOPHTORA	Buena	Muy buena	Baja
RESISTENCIA A VERTICILLIUM DHALIAE KLEB	Susceptible	Susceptible	Tolerante
Eficiencia nutricional			
ABSORCIÓN DE COBRE	Elevada	Media	Baja
ABSORCIÓN DE ZINC	Media-Alta	Media-Baja	Baja
ABSORCIÓN BORO	Media	Buena	Baja
ABSORCIÓN CLORO	Baja	Media-Alta	Baja
ABSORCIÓN DE SODIO	Baja	Media-Alta	Baja

