



agróptimum
olivo



/ Denominación

Es conocida con diversas denominaciones que generalmente hacen referencia a la forma curvada o alargada de su fruto como cabrilla, cornal, cornatillo, cornetilla...

Presenta una elevada resistencia al desprendimiento del fruto. Adaptación a suelos pobres y zonas secas y frías. Es especialmente sensible a tuberculosis, verticilosis y repilo. También es sensible a los ataques de mosca.



/ Difusión e importancia

Es la segunda variedad española en cuanto a superficie cultivada. Actualmente ocupa más de 270.000 ha en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Badajoz y Cáceres.



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Tardía
POLEN	Baja germinabilidad
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Tardía
PRODUCCIÓN	Elevada y alternante
MADURACIÓN DE FRUTO	Tardía
RENDIMIENTO GRASO	Alto
PROPAGACIÓN	Fácil por estaquillado semileñoso
ACEITE	Presenta un color amarillo oro con reflejos verdosos que anticipan el atributo afrutado

CARACTERES MORFOLÓGICOS


Árbol	
VIGOR	Bajo
PORTE	Erguido
DENSIDAD DE LA COPA	Espesa
Hoja	
FORMA	Elíptico-Lanceolada
LONGITUD	Media
ANCHURA	Media
CURVATURA	Espesa
Fruto	
PESO	Medio
FORMA	Alargada
GRADO DE ASIMETRÍA	Asimétrico
DIÁMETRO	Centrado
ÁPICE	Apuntado
BASE	Truncada
PEZÓN	Ausente
LENTICELAS	Abundantes y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Rojo vinoso



/ Denominación

La denominación de esta variedad hace referencia a la forma apuntada que presentan sus frutos. También se ha encontrado con las siguientes sinonimias: Andaluza, Blanca, Corriente, Grosal, Jabata...

Alta capacidad de brotación tras podas severas. Presenta baja resistencia al desprendimiento lo que facilita su mecanización. Sensible al repilo y verticilosis.



/ Difusión e importancia

Es la variedad más importante de España. Actualmente ocupa en Andalucía más de 850.000 ha, dominando en provincias de Jaén (97%), Córdoba (38%) y Granada (40%). Es la base de las nuevas plantaciones en todo el país.



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Media
POLEN	Autofértil
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Precoz
PRODUCCIÓN	Elevada y constante
MADURACIÓN DE FRUTO	Precoz
RENDIMIENTO GRASO	Alto Elevado
PROPAGACIÓN	Fácil por estaca y estaquilado semileñoso
ACEITE	Los aceites de llano tienen gran cuerpo, normalmente amargos, con cierto sabor a madera

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Árbol	
VIGOR	Medio
PORTE	Abierto
DENSIDAD DE LA COPA	Espesa
Hoja	
FORMA	Elíptico-Lanceolada
LONGITUD	Media
ANCHURA	Media
CURVATURA	Biponástica
Fruto	
PESO	Medio
FORMA	Ovoidal
GRADO DE ASIMETRÍA	Asimétrico
DIÁMETRO	Centrado
ÁPICE	Redondeado
BASE	Inexistente
PEZÓN	Ausente o esbozado
LENTICELAS	Abundantes y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Negro



/ Denominación

Esta denominación hace referencia al color claro de sus hojas. También se le conoce en diversas localidades cordobesas con las sinonimias de Casta de Lucena en Cabra y Lucentino en Baena, Cabra y Castro del Río.

Su capacidad de enraizamiento se considera media. Sus frutos presentan una elevada resistencia al desprendimiento que dificulta la recolección mecanizada.



/ Difusión e importancia

Es la tercera variedad española en cuanto a superficie cultivada. Actualmente ocupa más de 265.000 ha en las provincias de Córdoba (43%), Málaga (30%), Sevilla (17%) y Granada (10%).



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Media-Tardía
POLEN	Calidad media
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Media
PRODUCCIÓN	Elevada y alternante
MADURACIÓN DE FRUTO	Tardía
RENDIMIENTO GRASO	Bajo
PROPAGACIÓN	Estaquillado
ACEITE	Ácidos grasos muy equilibrada, ácidos saturados relativamente más bajos que en otras variedades

CARACTERES MORFOLÓGICOS


Árbol	
VIGOR	Medio
PORTE	Erguido
DENSIDAD DE LA COPA	Media
Hoja	
FORMA	Lanceolada
LONGITUD	Larga
ANCHURA	Media
CURVATURA	Plana
Fruto	
PESO	Elevado
FORMA	Ovoidal
GRADO DE ASIMETRÍA	Simétrico
DIÁMETRO	Centrado
ÁPICE	Redondeado
BASE	Redondeada
PEZÓN	Ausente
LENTICELAS	Abundantes y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Violeta negro



/ Denominación

Toponímico de Arbeca, localidad de Lérida dónde se supone que se inició su cultivo.

De vigor reducido, lo que permite su utilización en plantaciones intensivas. Posee una capacidad de enraizamiento elevada.



/ Difusión e importancia

Es la variedad más importante de Cataluña donde ocupa más de 55.000 ha. También se encuentra ampliamente difundida en Aragón y, recientemente, en Andalucía, donde ocupa más de 20.000 ha en plantaciones intensivas.



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Media
POLEN	Calidad media
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Precoz
PRODUCCIÓN	Elevada
MADURACIÓN DE FRUTO	Temprana
RENDIMIENTO GRASO	Elevada
PROPAGACIÓN	Estaquillado
ACEITE	Calidad excelente, por sus buenas características organolépticas, aunque de baja estabilidad.

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Árbol	
VIGOR	Bajo
PORTE	Abierto
DENSIDAD DE LA COPA	Media
Hoja	
FORMA	Elíptica
LONGITUD	Corta
ANCHURA	Media
CURVATURA	Epinástica
Fruto	
PESO	Bajo
FORMA	Esférica
GRADO DE ASIMETRÍA	Simétrico
DIÁMETRO	Hacia la base
ÁPICE	Redondeado
BASE	Redondeada
PEZÓN	Ausente
LENTICELAS	Escasas y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Negro